



**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан
в Ахтынском районе**

Об осложнении эпидемической ситуации по кори и мерах по профилактике

В Республике Дагестан продолжается эпидемическое неблагополучие по кори, за текущий период 2013 г. 230 лабораторно подтвержденных случаев кори, из которых 82 (35,6%) среди детей до 17 лет.

Наиболее интенсивно в эпидемический процесс кори в ноябре-декабре вовлечены города Махачкала, Каспийск, Буйнакс, на которых приходится 57,5% от числа случаев кори, зарегистрированных в целом по республике.



Продолжаются заносы кори из Республики Дагестан в другие регионы Российской Федерации (Ставропольский край, Астраханская, Московская, Волгоградская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.г. Санкт-Петербург, Тула, Москва, Ханты-Мансийск).

В Ахтынском районе зарегистрирован 1 случай кори ? - 9 декабря 2013г. у ребенка 8 лет, из с. Хнов, выехавшего в г.Махачкала 28 ноября 2013г. и находившегося на лечении в одной из больниц г. Махачкалы по поводу другого заболевания. Впоследствии диагноз кори у этого ребенка снят. Других больных либо людей с подозрением на корь на территории района не зарегистрировано.

В очагах кори организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Угрозе заболевания подвергаются не привитые и не болевшие корью лица. Особую опасность корь представляет для детей в возрасте до 1 года, не подлежащих прививкам по возрасту, и взрослых в связи с более тяжёлым течением заболевания и вероятностью развития осложнений.

Корь—это острое инфекционное высококонтагиозное вирусное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, высокой температурой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и сопровождается сыпью. Вирус кори передается здоровому человеку от больного воздушно-капельным путем при чихании, кашле, разговоре и даже дыхании.

Для инфекции характерна почти 100-процентная восприимчивость, любой контакт непривитого человека с заболевшим корью приводит к заболеванию.

Заразиться корью можно, даже зайдя в помещение, в котором за несколько часов до того находился больной.

Заболевший корью заразен за 1-2 дня до возникновения первых признаков болезни и до 5 дня после появления сыпи.

С момента заражения до появления признаков заболевания проходит в среднем от 9 до 14 дней. Заболевание начинается остро. Отмечается подъем температуры тела до 38-40°, у больного появляются насморк, кашель, осиплость голоса, конъюнктивит, покраснение и отек век.

Нарастает общая интоксикация, слабость, увеличиваются лимфатические узлы. Спустя несколько дней от момента заболевания появляется главный признак кори – специфическая сыпь. Сначала сыпь появляется на голове, затем на лице, шее и в течение следующих 2-х суток спускается и покрывает все конечности и туловище и держится 5-6 дней.

Исчезают высыпания также постепенно, оставляя на местах своего появления пигментацию, которая проходит через несколько дней.

Особенно опасна корь развитием осложнений. Если у детей наиболее частые осложнения отмечаются со стороны дыхательных органов – пневмонии, ларингиты и ларинготрахеиты, то у взрослых чаще наблюдается поражение головного мозга и его оболочек, которое проявляется в виде менингита, менингоэнцефалита, энцефалита. Нередко регистрируется воспаление нервных корешков (полиневрит).

Специфического лечения кори не существует. Поэтому корь легче предупредить.

Единственной мерой профилактики этой инфекции является вакцинация, которая проводится с использованием живых вакцин, содержащих ослабленный вирус кори.

Вакцинация против кори включена в Национальный календарь профилактических прививок. Детей вакцинируют дважды: в 1 год и в 6 лет. Двух прививок достаточно, чтобы на всю жизнь защитить от этого опасного заболевания. Взрослые в возрасте до 35 лет должны быть привиты двукратно. Если человек не был привит в детстве и не болел корью, либо данные о прививках были утеряны – проводятся 2 прививки с интервалом между прививками не менее 3 месяцев.

По эпидемическим показаниям вакцинируют контактные лица в очагах кори не болевшие, не привитые и привитые однократно, а также не имеющие сведений о профилактических прививках против кори без ограничения возраста.

Сделать прививку против кори можно даже в первые 3 дня после контакта с заболевшим корью. После вакцинации создается длительный, как правило, пожизненный иммунитет.

Чтобы сохранить здоровье себе, своим детям и окружающим:

- позаботьтесь о том, чтобы Вы сами и Ваши дети были привиты против кори, не отказывайтесь от профилактической прививки;
- если Вы заболели, обращайтесь к врачу при появлении первых симптомов заболевания и не отказывайтесь от госпитализации;

- избегайте места массового скопления людей;
- чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку.